



## Læbeløft

Overlæben bliver typisk længere med alderen, hvilket gør det læberøde smallere og mindre synligt. Dette påvirker smilet, så tænderne ikke længere ses lige så flot, når man smiler.

Læbeløft, også kendt som læbeforkortning, har til formål at forbedre størrelsen og formen på overlæben - specifikt huden mellem næseborene og overlæben. Dette gør det læberøde mere synligt og forbedrer balancen mellem læbe og næse i dit ansigt. Arret fra operationen skjules omhyggeligt langs næseborene.

Selvom læbeløft ofte kombineres med ansigtsløftning og fedtinjektion til læberne, kan det også udføres som en procedure for sig selv. Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer typisk ca. 1 time. De fleste patienter vil have behov for at være sygemeldt et par dage efter operationen og det anbefales, at man venter med at genoptage normal fysisk aktivitet i mindst en uge efter operationen.

### Mulige risici og komplikationer

**Infektion:** Risikoen for infektion er minimal, da læben har en høj blodgennemstrømning. Patienter som ryger eller som har en meget fin og tynd hud, er mere tilbøjelige til at få infektion, ofte i arrene. Hvis dette sker, skal man have antibiotika og arrene skal holdes rene.

**Blødning og hævelse:** Risikoen for blødning er ligeledes minimal. Der kan opstå blå mærker, og overlæben vil være hævet den første uges tid.

**Følelsesløshed:** Huden under næsen kan være følelsesløs i op til 6 måneder.

**Synlige ar:** Der er en lille risiko for at udvikle tykke ar, især hos personer med mørk hud og hvis man har arveligt anlæg for tykke ar. Ar kan forbedres med iPRF eller microneedling.

### Varighed af resultatet

Resultatet er stabilt efter ca. 3 måneder og påvirkes af de naturlige ældningsprocesser.